

核准日期：2019 年 12 月 26 日

修改日期：2020 年 02 月 21 日

2020 年 06 月 22 日

2020 年 07 月 02 日

2022 年 03 月 07 日

2023 年 05 月 04 日

2024 年 03 月 20 日

2024 年 09 月 02 日

2024 年 12 月 12 日

2025 年 02 月 20 日

## 古塞奇尤单抗注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用

本品仅用于皮下给药。

如需静脉给药时，请使用静脉制剂。

### 【药品名称】

通用名称：古塞奇尤单抗注射液

商品名称：特诺雅/Tremfya

英文名称：Guselkumab Injection

汉语拼音：Gusaiqiyou Dankang Zhusheye

### 【成份】

主要成份：古塞奇尤单抗。

古塞奇尤单抗是一种使用 DNA 重组技术在中国仓鼠卵巢（CHO）细胞中产生的全人源免疫球蛋白 G1 $\lambda$ （IgG1 $\lambda$ ）单克隆抗体（mAb）。

辅料：L-组氨酸、L-组氨酸盐酸盐一水合物、聚山梨酯 80、蔗糖、注射用水。

## 【性状】

透明的无色至浅黄色液体。

## 【适应症】

### 斑块状银屑病：

本品适用于适合系统性治疗的中重度斑块状银屑病成人患者。

### 克罗恩病：

本品适用于治疗对传统治疗或生物制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病成人患者。

## 【规格】

100 mg/1 mL/支

## 【用法用量】

本品仅用于皮下给药。如需静脉给药时，请使用静脉制剂。

本品应在医生的指导及监督下使用，医生应具备本品适应症的诊断及治疗经验。

## 剂量

### 斑块状银屑病：

本品推荐剂量为第 0 周和第 4 周时皮下给药 100 mg，之后每 8 周接受一次相同剂量维持。

治疗 16 周后仍未应答的患者应考虑停止用药。

### 克罗恩病：

古塞奇尤单抗用于克罗恩病的诱导治疗和维持治疗。

### 诱导治疗：

用于诱导治疗的推荐剂量为第 0、4 和 8 周时静脉给药 200 mg，静脉给药时间为至少 1 小时。

### 维持治疗：

在完成诱导治疗后，本品用于维持治疗的推荐剂量为第 16 周时皮下给药 100mg，之后每 8 周接受一次相同剂量维持。

对于诱导治疗未显示充分治疗获益的患者，根据临床判断，可考虑在第 12 周时皮下给药 200mg，之后每 4 周接受一次相同剂量维持（参见【临床试验】）。

本品治疗期间可继续使用免疫调节剂和/或皮质类固醇。对本品治疗有应答的患者可根据标准治疗实践降低皮质类固醇剂量或停用皮质类固醇。

#### 肾功能/肝功能损伤

尚未在这些患者中研究过本品。因此无法提供推荐剂量。

#### 儿童患者

参见【儿童用药】。

#### 老年患者

参见【老年用药】。

#### 体重

无需根据体重进行剂量调整（参见【临床药理】）。

#### 给药方法

本品仅可用于皮下给药。应尽量避免在出现银屑病症状的皮肤区域注射。

在经过适当的皮下注射技术培训后，若医生认为适合，患者可自行注射本品。然而，医生仍要确保对患者进行适当的医学随访。应按照纸盒中提供的“使用指南”指导患者进行本品全剂量注射。

如果错过一次用药，应尽快给药。此后，恢复在规定时间内定期给药。

#### 【不良反应】

#### 成人受试者中的临床研究数据

古塞奇尤单抗的安全性特征是基于在 5926 例受试者（包括斑块状银屑病和克罗恩病等适应症）中进行的 II 期研究以及 III 期研究的数据。表 1 列出了古塞奇尤单抗的暴露持续时间。

**表 1：II 期和 III 期临床研究中古塞奇尤单抗的长期暴露**

暴露持续时间	受试者例数
≥1 年	4632
≥2 年	1953
≥3 年	1482
≥4 年	1393

暴露持续时间	受试者例数
≥5 年	950

## 不良反应

古塞奇尤单抗的药物不良反应参见表 2。不良反应的发生频率是基于斑块状银屑病和克罗恩病等研究在安慰剂对照期间发生的不良反应。总体而言，安全性特征在不同剂量和不同适应症之间大体一致。在各发生频率分组中，在指定的系统器官分类范围内，使用下列标准，按照发生频率降序排列显示不良反应：

十分常见（≥1/10）

常见（频繁；≥1/100 至 <1/10）

偶见（不频繁；≥1/1000 至 <1/100）

罕见（≥1/10000 至 <1/1000）

**表 2：临床研究中的不良反应总结**

感染及侵染类疾病	十分常见：呼吸道感染 <sup>a</sup> 偶见：单纯疱疹感染 <sup>b</sup> 、癣菌感染 <sup>c</sup> 、胃肠炎
各类检查	常见：转氨酶升高 <sup>d</sup> 偶见：中性粒细胞计数降低
神经系统病变	常见：头痛
胃肠系统疾病	常见：腹泻
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	常见：关节痛
全身性疾病及给药部位各种反应	偶见：注射部位反应 <sup>e</sup>
皮肤和皮下组织类疾病	常见：皮疹 <sup>f</sup>

<sup>a</sup> 呼吸道感染：支气管炎、鼻咽炎、咽炎、呼吸道感染、鼻窦炎、上呼吸道感染、COVID-19、流行性感

<sup>b</sup> 单纯疱疹感染：生殖器疱疹、生殖器单纯疱疹、单纯疱疹、疱疹病毒感染、鼻疱疹、口腔疱疹

<sup>c</sup> 癣菌感染：体癣、股癣、癣菌感染、手癣、足癣、花斑癣

<sup>d</sup> 转氨酶升高：丙氨酸氨基转移酶升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、肝酶升高、高转氨酶血症、肝功检查异常、肝脏功能检查值升高、转氨酶升高、肝功能异常

<sup>e</sup> 注射部位反应：注射部位红斑、注射部位疼痛、注射部位反应

<sup>f</sup> 皮疹：皮疹、红斑性发疹、丘疹样皮疹、瘙痒性皮疹

## 特定的不良反应的描述

### 转氨酶升高

在合并的 II/III 期克罗恩病临床研究中，在安慰剂对照诱导治疗期（第 0-12 周），古塞奇尤单抗治疗组中转氨酶升高（包括 ALT 升高、AST 升高、肝酶升高、转氨酶升高、肝脏功能检查值升高）不良事件的发生率（1.7%）高于安慰剂组（0.6%）。在合并的 II/III 期克罗恩病临床研究中，在大约 1 年的报告期内，古塞奇尤单抗 200 mg SC q4w 治疗组、古塞奇尤单抗 100 mg SC q8w 治疗组和安慰剂组分别有 3.4%、4.1% 和 2.4% 的受试者报告转氨酶升高（包括 ALT 升高、AST 升高、肝酶升高、转氨酶升高、肝功能异常、肝脏功能检查值升高）不良事件。

在合并的 II/III 期克罗恩病临床研究中，在大约 1 年的报告期内，古塞奇尤单抗 200 mg SC q4w 治疗组、古塞奇尤单抗 100 mg SC q8w 治疗组和安慰剂组分别有 2.7%、2.6% 和 1.9% 的受试者报告 ALT 升高 $\geq 3 \times \text{ULN}$  或 AST 升高 $\geq 3 \times \text{ULN}$ 。在大多数病例中，转氨酶升高为一过性，且未导致停药。

### 胃肠炎

在斑块状银屑病研究（VOYAGE 1 和 VOYAGE 2）的安慰剂对照期内，古塞奇尤单抗治疗组胃肠炎的发生率（1.1%）高于安慰剂治疗组（0.7%）。截至第 264 周，接受古塞奇尤单抗治疗的受试者中有 5.8% 报告了胃肠炎。不良反应胃肠炎为非严重事件，264 周内未导致古塞奇尤单抗停药。

### 注射部位反应

斑块状银屑病研究（VOYAGE 1 和 VOYAGE 2）至第 48 周的数据表明，0.7% 的古塞奇尤单抗注射和 0.3% 的安慰剂注射发生了注射部位反应。至第 264 周，0.4% 的古塞奇尤单抗注射发生了注射部位反应。注射部位反应的严重程度通常为轻度至中度，无严重事件，均未导致古塞奇尤单抗停药。

### 免疫原性

抗药抗体的阳性率数据高度依赖于分析方法的灵敏度和特异性。

### 斑块状银屑病

在 II 期和 III 期研究的合并分析中，在长达 52 周的治疗中 <6% 接受古塞奇尤单抗治疗的受试者产生抗药抗体。在产生抗药抗体的受试者中，约 7% 被归类为中和抗体，相当于所有接受古塞奇尤单抗治疗的受试者中有 0.4% 产生中和抗体。在 III 期研究的合并分析中，在长达 264 周的治疗中，约 15% 接受古塞奇尤单抗治疗的受试者产生了抗药抗体。在产生抗药抗体的受试者中，约 5% 被归类为中和抗体，相当于所有接受古塞奇

尤单抗治疗的受试者有 0.76% 产生中和抗体。抗药抗体与疗效降低或注射部位反应的发生无关。

### 克罗恩病

在合并 II/III 期研究 (GALAXI) 截至第 48 周的分析中, 古塞奇尤单抗治疗组 5% (30/364) 的受试者产生抗药抗体。在产生抗药抗体的这些受试者中, 7% (2/30) 被归类为中和抗体, 相当于所有接受古塞奇尤单抗治疗的受试者中有 0.3% (2/634) 产生中和抗体。

在 III 期研究 (GRAVITI) 截至第 48 周的分析中, 古塞奇尤单抗治疗组 9% (24/273) 的受试者产生抗药抗体。在产生抗药抗体的这些受试者中, 13% (3/24) 被归类为中和抗体, 相当于所有接受古塞奇尤单抗治疗的受试者中有 1% (3/273) 产生中和抗体。

大部分抗古塞奇尤单抗抗体阳性受试者的抗体滴度较低。抗古塞奇尤单抗抗体与药代动力学和临床疗效的变化以及注射部位反应的发生之间无关。

### 上市后数据

在上市后经验中还报告了以下不良反应。由于这些不良反应事件为自发性报告, 且样本量不确定, 因此不太可能准确估计不良反应的发生频率或确定其与用药之间的因果关系。

免疫系统疾病: 超敏反应, 包括速发严重过敏反应<sup>a</sup>

皮肤及皮下组织类疾病: 荨麻疹<sup>b</sup>

a 速发严重过敏反应: 速发严重过敏反应、过敏性休克、类过敏反应、类过敏性休克、I 型超敏反应。

b 荨麻疹: 注射部位荨麻疹、机械性荨麻疹、荨麻疹、丘疹性荨麻疹、压力性荨麻疹。

### 【禁忌】

- 对活性成分或列出的任何辅料有严重超敏反应者禁用。
- 有重要临床意义的活动性感染者禁用 (如活动性结核病)。
- 由于缺乏配伍性研究, 因此禁止将本品与其他药物混合使用。

### 【注意事项】

#### 可追踪性

为了提高生物药品的可追踪性, 应明确记录所使用药品的名称和批号。

## 感染

古塞奇尤单抗可能增加感染的风险。对有任何重要临床意义的活动性感染的患者，在感染痊愈后或得以充分治疗后方可开始古塞奇尤单抗治疗。

在斑块状银屑病（古塞奇尤单抗组 23% vs 安慰剂组 21%；两组中严重感染均 $\leq$  0.2%）的临床试验中观察到感染事件。在克罗恩病的安慰剂对照期试验中观察到相似感染风险。

如果接受古塞奇尤单抗治疗的患者出现具有重要临床意义的慢性或急性感染体征或症状，应指导其立即就医。如果患者出现具有重要临床意义的感染或严重感染或者使用标准治疗后无法缓解，则应对其进行密切监测，且在感染痊愈前不应继续使用古塞奇尤单抗。

## 治疗前结核病评估

在临床研究中，有潜伏性结核（TB）的受试者在同时接受古塞奇尤单抗治疗和适当的 TB 预防治疗后未发生 TB。开始古塞奇尤单抗治疗之前，应评估患者是否存在 TB 感染。开始古塞奇尤单抗治疗之前，应先开始潜伏性 TB 治疗。在接受古塞奇尤单抗治疗的过程中及结束后，应密切监测患者的活动性 TB 的体征和症状。在使用古塞奇尤单抗治疗前，应考虑对有潜伏性或活动性结核病既往病史且不能确定已接受足够疗程的患者进行抗结核病治疗。活动性 TB 感染患者不能接受古塞奇尤单抗治疗。

## 超敏反应

上市后报告了严重超敏反应（包括速发严重过敏反应）。部分严重超敏反应发生在古塞奇尤单抗治疗几天后，包括荨麻疹和呼吸困难病例。一旦发生严重超敏反应，应立即停用古塞奇尤单抗，并给予适当的治疗。

## 肝转氨酶升高

在克罗恩病临床研究中，在接受古塞奇尤单抗治疗的受试者中观察到肝酶升高的发生率增加（参见【不良反应】章节）。

建议根据常规的患者管理，在基线和治疗中对肝酶进行监测。如果观察到丙氨酸氨基转移酶（ALT）或天门冬氨酸氨基转移酶（AST）升高，并且怀疑是药物诱导的肝损伤，则应暂停本品治疗，直至排除该诊断。

## 免疫作用

在开始古塞奇尤单抗治疗之前，应根据现行的免疫接种指南，考虑完成所有适龄免疫接种。接受古塞奇尤单抗治疗的患者不应同时接种活疫苗。目前尚无对活疫苗或灭活疫苗应答的影响相关数据可用。

古塞奇尤单抗末次给药后至少停药 12 周，方可接种活病毒或活细菌疫苗；接种疫苗至少 2 周后，才可重新开始古塞奇尤单抗治疗。有关接种疫苗后合并使用免疫抑制剂的更多信息和指南，处方医生应参考特定疫苗的产品特征概要。

#### 废弃物处置和其他操作注意事项

将预充式注射器从冰箱中取出后，将预充式注射器放在包装盒内，并在注射古塞奇尤单抗前等待 30 分钟，以达到室温。不得振摇预充式注射器。

在使用前，建议目视检查预充式注射器。古塞奇尤单抗溶液为透明的无色至浅黄色液体，可能含有少量白色或透明颗粒。如古塞奇尤单抗溶液混浊或变色，或颗粒较大，请勿使用。

每个古塞奇尤单抗包装均提供一份“使用指南”，其中详细描述了预充式注射器的制备和给药。

未用完的药品或废料应按当地要求进行处理。

#### 对驾驶和使用机器能力的影响

未针对古塞奇尤单抗对驾驶和使用机器的能力的影响开展任何研究。

#### 请将本品放在儿童不能接触的地方

### **【孕妇及哺乳期妇女用药】**

#### 有生育能力的女性

在治疗期间及治疗后至少 12 周内，有生育能力的女性应使用有效的避孕措施。

#### 妊娠

尚未对本品在妊娠女性中的使用情况进行研究。尚不清楚本品对人类妊娠的影响。在一项胚胎-胎崽发育毒性和围产期发育毒性联合研究中，在胚胎器官发生期至分娩期间，经皮下注射给予妊娠猴古塞奇尤单抗，在给药剂量达人静脉给药 200 mg 后暴露量（AUC）的 4-18 倍和皮下给药 200 mg 后暴露量（AUC）的 7-32 倍的给药组中，观察到有新生猴崽死亡。这些结果的临床意义尚不明确。新生猴崽中未见不良发育影响。此外，与其他 IgG 抗体相同，古塞奇尤单抗可穿过胎盘，且在新生食蟹猴血浆样本中可检测到古塞奇尤单抗，也表明药物可经胎盘转移。

作为预防措施，最好避免在妊娠期间使用本品，除非获益明显超过对母体和胎儿的任何潜在风险。



## 哺乳

尚无关于人乳中存在古塞奇尤单抗、对母乳喂养婴儿的影响或对产奶影响的信息。在哺乳食蟹猴的乳汁中未检测到古塞奇尤单抗（参见【药理毒理】）。内源性母体 IgG 和单克隆抗体可转移至人乳汁中，尚不清楚哺乳婴儿中局部胃肠道暴露和全身暴露程度的影响。应考虑母乳喂养对发育和健康的益处、母亲对本品的临床需求以及对母乳喂养婴儿的任何潜在不良影响。

## 生育力

尚未评价古塞奇尤单抗对人类生育能力的影响。在雌性和雄性豚鼠生育力研究中，未发现古塞奇尤单抗对生育能力有直接或间接的有害作用（参见【药理毒理】）。

### **【儿童用药】**

尚未确定古塞奇尤单抗用于 18 岁以下儿童和青少年的安全性和疗效。暂无可用数据。

### **【老年用药】**

老年人（≥65 岁）无需调整给药剂量。

在 II 期和 III 期临床研究中暴露于古塞奇尤单抗的 5926 例受试者中，共有 339 例受试者年龄在 65 岁及以上，34 例受试者的年龄在 75 岁及以上。在本品不同适应症的临床研究中纳入的 ≥65 岁的受试者例数不足以确认其对本品的反应是否与年轻受试者有所不同。药代动力学分析未发现年龄影响（见【临床药理】）。

### **【药物相互作用】**

## 活疫苗

接受本品治疗的患者应避免在治疗期间接种活疫苗。

## CYP450 底物

在慢性炎症中，CYP450 酶的形成可因某些细胞因子水平（如 IL-1、IL-6、IL-10、TNF $\alpha$ 、干扰素）的升高而发生改变。

一项在中重度银屑病受试者中进行的探索性药物间相互作用研究的结果表明，经 CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19 和 CYP1A2 代谢的药物发生与临床相关的药物间相互作用的可能性较低，但不能排除经 CYP2D6 代谢的药物间相互作用的可能性。然而，由于研究中的受试者数量有限，结果具有高度变异性。

对于合并使用 CYP450 底物（特别是治疗指数狭窄的 CYP450 底物）的患者，在开始使用本品之前，应考虑监测药物的治疗效果或药物浓度，并考虑调整剂量。

### 合并免疫抑制治疗或光疗

在银屑病研究中尚未评估古塞奇尤单抗联合免疫抑制剂（包括生物制剂）或光疗时的安全性和疗效。

在克罗恩病研究中，未发现联用免疫调节剂（例如，硫唑嘌呤）或皮质类固醇对古塞奇尤单抗的安全性或疗效产生影响。

### **【药物过量】**

在临床研究中，单次给予古塞奇尤单抗静脉给药剂量最高 1200 mg 以及皮下给药剂量最高 400 mg 时，未发现剂量限制性毒性。如果发生用药过量，监测患者的任何不良反应体征或症状，并立即提供适当的对症治疗。

### **【临床药理】**

#### 作用机制

参见【药理毒理】相关内容。

#### 药效学

基于药效学标记物的探索性分析，相对于治疗前水平，古塞奇尤单抗可降低银屑病受试者的血清 IL-17A、IL-17F 和 IL-22 水平。

在克罗恩病受试者中，古塞奇尤单抗治疗后，炎症标记物（包括 CRP、粪便钙卫蛋白）的水平下降维持至诱导治疗第 12 周。最早在第 4 周就观察到血清蛋白 IL-17A、IL-22 和 IFN  $\gamma$  水平的下降，并且持续下降至诱导治疗第 12 周。第 12 周时，古塞奇尤单抗可降低结肠黏膜活检中的 IL-17A、IL-22 和 IFN  $\gamma$  的 RNA 水平。

这些药效学标记物与古塞奇尤单抗发挥其临床疗效的机制之间的关系尚不明确。

#### 药代动力学

##### 吸收

健康受试者单次皮下注射 100 mg 药物后，在给药后约 5.5 天时古塞奇尤单抗平均（ $\pm$  SD）血清浓度达到最大（ $C_{max}$ ），为  $8.09 \pm 3.68$  mcg/mL。健康受试者单次皮下注射 100 mg 药物后，古塞奇尤单抗的绝对生物利用度估计约为 49%。

在斑块状银屑病受试者中，第 0 周和第 4 周以及之后每 8 周一次皮下注射 100 mg 古塞奇尤单抗后，至第 20 周时古塞奇尤单抗血清浓度达到稳态。在两项 III 期研究中，

平均 (± SD) 稳态血清古塞奇尤单抗谷浓度为  $1.15 \pm 0.73$  mcg/mL 和  $1.23 \pm 0.84$  mcg/mL。

按照古塞奇尤单抗推荐的静脉诱导给药方案 (第 0、4 和 8 周时 200 mg 给药) 给药后, 第 8 周时, 克罗恩病受试者中的平均古塞奇尤单抗血清峰浓度为 70.5 mcg/mL。

古塞奇尤单抗 100 mg 每 8 周一次皮下维持给药或 200 mg 每 4 周一次皮下维持给药后, 克罗恩病受试者中的平均稳态古塞奇尤单抗血清谷浓度在第 48 周时分别大约为 1.2 mcg/mL 和 10.1 mcg/mL。

### 分布

不同研究中, 健康受试者单次静脉给药后, 终末期分布容积 ( $V_z$ ) 的均值范围约为 7-10 L。

### 代谢

尚未确定古塞奇尤单抗的确切代谢途径。古塞奇尤单抗作为人源化 IgG mAb, 预期可通过与内源性 IgG 相同的分解代谢途径降解成小肽和氨基酸。

### 消除

不同研究中, 健康受试者单次静脉给药后, 全身清除率 (CL) 均值的范围为 0.288 - 0.479 L/天。不同研究中, 健康受试者的古塞奇尤单抗半衰期 ( $T_{1/2}$ ) 均值约为 17 天, 在斑块状银屑病受试者中约为 15-18 天, 在克罗恩病受试者中约为 17 天。

### 剂量线性

在健康受试者或斑块状银屑病受试者中单次皮下注射 10 mg - 300 mg 药物后, 古塞奇尤单抗的全身暴露量 ( $C_{max}$  和 AUC) 的增加比例接近于剂量的增加比例。克罗恩病受试者接受静脉给药后, 古塞奇尤单抗血清浓度大致与剂量成比例。

### 中国健康受试者药代动力学

在中国健康受试者中, 古塞奇尤单抗 100 mg 和 200 mg 单次皮下给药或古塞奇尤单抗 200 mg 和 400 mg 单次静脉给药后, 观察到 AUC 和  $C_{max}$  大体与剂量成比例增加。100 mg 或 200 mg 单次皮下给药后, 古塞奇尤单抗的平均绝对生物利用度 (F) 估计约为 52.7%-62.5%。静脉和皮下给药后古塞奇尤单抗的平均  $T_{1/2}$  基本一致, 200 mg 和 400 mg 单次静脉给药的平均  $T_{1/2}$  分别为 17.2 天、22.1 天, 100 mg 和 200 mg 单次皮下给药的平均  $T_{1/2}$  分别为 16.9 天、19.4 天。

## 老年人群

未在老年患者中开展专项研究。在暴露于古塞奇尤单抗并纳入群体药代动力学分析的 1384 例斑块状银屑病受试者中，70 例受试者 $\geq 65$  岁，其中 4 例受试者 $\geq 75$  岁。在临床研究中暴露于古塞奇尤单抗并被纳入群体药代动力学分析的 1009 例克罗恩病受试者中，共 39 例受试者 $\geq 65$  岁，其中 5 例受试者 $\geq 75$  岁。群体药代动力学分析表明，与 $< 65$  岁受试者相比， $\geq 65$  岁受试者的表观清除率（CL/F）估值无明显变化，表明老年受试者无需调整剂量。

## 肾功能/肝功能损伤人群

尚未开展确定肾功能或肝功能损伤对古塞奇尤单抗药代动力学影响的专项研究。预期完整古塞奇尤单抗（一种 IgG mAb）的肾脏清除率较低且肾脏清除非主要的清除途径；同样，由于 IgG mAb 主要经细胞内分解代谢清除，预期肝损伤不会影响古塞奇尤单抗的清除率。

## 体重对药代动力学的影响

群体药代动力学分析发现，体重对清除率和分布容积有显著影响，体重越高，清除率越高。然而，随后的暴露量-效应建模分析表明，无需根据体重进行剂量调整。

## 药物相互作用

群体药代动力学分析表明，联用非甾体抗炎药（NSAIDs）、口服皮质类固醇和传统改善病情的抗风湿药物（DMARD，例如甲氨蝶呤[MTX]、硫唑嘌呤[AZA]、6-巯基嘌呤[6-MP]）不影响古塞奇尤单抗的清除率。

## 遗传药理学

尚未开展相关研究。无可用数据。

## **【临床试验】**

### 中重度斑块状银屑病

在 3 项随机、双盲、活性对照 III 期研究中，评估了中重度斑块状银屑病、并适合接受光疗或系统性治疗的成人受试者接受古塞奇尤单抗的疗效和安全性。

### *VOYAGE 1 和 VOYAGE 2*

两项研究（VOYAGE 1 和 VOYAGE 2）在 1829 例成人受试者中评价了古塞奇尤单抗对比安慰剂和阿达木单抗的疗效和安全性。被随机分配至古塞奇尤单抗组（N=825）的受试者在第 0 周和第 4 周时接受 100 mg 给药，之后每 8 周一次（q8w），直至第 48 周（VOYAGE 1）和第 20 周（VOYAGE 2）。被随机分配至阿达木单抗组（N=582）的

受试者在第 0 周接受 80 mg 给药，第 1 周接受 40 mg 给药，随后每隔一周接受 40 mg 给药（q2w），直至第 48 周（VOYAGE 1）和第 23 周（VOYAGE 2）。在两项研究中，被随机分配至安慰剂组的受试者（N=422）在第 16 周、第 20 周以及之后每 8 周一次接受古塞奇尤单抗 100 mg 给药。在 VOYAGE 1 中，所有受试者（包括第 0 周时随机分配至阿达木单抗组的受试者）在第 52 周开始接受开放性古塞奇尤单抗每 8 周一次治疗。在 VOYAGE 2 中，对于在第 0 周被随机分配至古塞奇尤单抗的受试者，在第 28 周达到银屑病面积和严重程度指数（PASI）90 的应答者被重新随机分配至继续接受每 8 周一次的古塞奇尤单抗治疗（维持治疗）或者接受安慰剂（退出治疗）。当退出治疗的受试者的相较于第 28 周 PASI 改善程度降低  $\geq 50\%$  时，则再次开始古塞奇尤单抗治疗（再次治疗时给药，4 周后和之后每 8 周一次治疗）。第 0 周时随机化至阿达木单抗组且 PASI 90 无应答者在第 28、32 周时接受古塞奇尤单抗治疗，之后每 8 周一次治疗。在 VOYAGE 2 中，所有受试者均是在第 76 周时开始接受开放性古塞奇尤单抗每 8 周一次治疗。

VOYAGE 1 和 2 研究人群的基线疾病特征一致，两项研究的中位体表面积（BSA）分别为 22% 和 24%，基线 PASI 评分中位数均为 19，基线皮肤病生活质量指数（DLQI）评分中位数分别为 14 和 14.5，分别有 25% 和 23% 的受试者的基线研究者总体评估（IGA）评分为重度，分别有 19% 和 18% 的受试者有银屑病关节炎病史。

在 VOYAGE 1 和 2 的所有受试者中，分别有 32% 和 29% 未使用过常规系统性治疗和生物制剂治疗，54% 和 57% 既往接受过光疗，62% 和 64% 既往接受过常规系统性治疗。两项研究中，21% 的受试者既往接受过生物治疗，其中 11% 接受过至少一种抗肿瘤坏死因子  $\alpha$ （TNF $\alpha$ ）制剂，约 10% 接受过抗 IL-12/IL-23 药物。

根据总体皮肤病、局部疾病（头皮、手足和指甲）以及生活质量和受试者报告结局评估古塞奇尤单抗的疗效。VOYAGE 1 和 2 的联合主要终点是：相较于安慰剂，第 16 周时 IGA 评分为清除或极轻度（IGA 0/1）和达到 PASI 90 应答的受试者比例（参见表 3）。

### 总体皮肤病

在第 16 周（相对于安慰剂和阿达木单抗）以及第 24 周和第 48 周（相对于阿达木单抗），古塞奇尤单抗治疗使得疾病活动度的测量结果显著改善。研究主要终点和重要次要终点的关键疗效结果见下表 3。

表 3: VOYAGE 1 及 VOYAGE 2 研究临床应答汇总

	受试者例数 (%)					
	VOYAGE 1			VOYAGE 2		
	安慰剂组 (N=174)	古塞奇尤单抗 (N=329)	阿达木单抗 (N=334)	安慰剂组 (N=248)	古塞奇尤单抗 (N=496)	阿达木单抗 (N=248)
<b>16 周</b>						
PASI 75	10 (5.7)	300 (91.2) <sup>a</sup>	244 (73.1) <sup>b</sup>	20 (8.1)	428 (86.3) <sup>a</sup>	170 (68.5) <sup>b</sup>
PASI 90	5 (2.9)	241 (73.3) <sup>c</sup>	166 (49.7) <sup>b</sup>	6 (2.4)	347 (70.0) <sup>c</sup>	116 (46.8) <sup>b</sup>
PASI 100	1 (0.6)	123 (37.4) <sup>a</sup>	57 (17.1) <sup>d</sup>	2 (0.8)	169 (34.1) <sup>a</sup>	51 (20.6) <sup>d</sup>
IGA 0/1	12 (6.9)	280 (85.1) <sup>c</sup>	220 (65.9) <sup>b</sup>	21 (8.5)	417 (84.1) <sup>c</sup>	168 (67.7) <sup>b</sup>
IGA 0	2 (1.1)	157 (47.7) <sup>a</sup>	88 (26.3) <sup>d</sup>	2 (0.8)	215 (43.3) <sup>a</sup>	71 (28.6) <sup>d</sup>
<b>24 周</b>						
PASI 75	-	300 (91.2)	241 (72.2) <sup>e</sup>	-	442 (89.1)	176 (71.0) <sup>e</sup>
PASI 90	-	264 (80.2)	177 (53.0) <sup>b</sup>	-	373 (75.2)	136 (54.8) <sup>b</sup>
PASI 100	-	146 (44.4)	83 (24.9) <sup>e</sup>	-	219 (44.2)	66 (26.6) <sup>e</sup>
IGA 0/1	-	277 (84.2)	206 (61.7) <sup>b</sup>	-	414 (83.5)	161 (64.9) <sup>b</sup>
IGA 0	-	173 (52.6)	98 (29.3) <sup>b</sup>	-	257 (51.8)	78 (31.5) <sup>b</sup>
<b>48 周</b>						
PASI 75	-	289 (87.8)	209 (62.6) <sup>e</sup>	-	-	-
PASI 90	-	251 (76.3)	160 (47.9) <sup>b</sup>	-	-	-
PASI 100	-	156 (47.4)	78 (23.4) <sup>e</sup>	-	-	-
IGA 0/1	-	265 (80.5)	185 (55.4) <sup>b</sup>	-	-	-
IGA 0	-	166 (50.5)	86 (25.7) <sup>b</sup>	-	-	-

<sup>a</sup> 古塞奇尤单抗与安慰剂之间比较的 p 值 < 0.001。

<sup>b</sup> 古塞奇尤单抗和阿达木单抗之间重要次要终点比较的 p 值 < 0.001。

<sup>c</sup> 古塞奇尤单抗和安慰剂之间联合主要终点比较的 p 值 < 0.001。


<sup>d</sup> 未进行古塞奇尤单抗和阿达木单抗之间的比较。

<sup>e</sup> 古塞奇尤单抗与阿达木单抗之间比较的 p 值 < 0.001。

随时间的应答


古塞奇尤单抗快速产生疗效，早在第 2 周时，PASI 百分比改善显著高于安慰剂组 ( $p < 0.001$ )。从第 8 周开始，古塞奇尤单抗组达到 PASI 90 应答的受试者百分比高于阿达木单抗组，在第 20 周左右差异达到最大值 (VOYAGE 1 和 2)，差异一直维持至第 48 周 (VOYAGE 1) (见图 1)。

图 1: 根据访视总结的、至第 48 周 VOYAGE 1 中达到 PASI 90 应答的受试者百分比 (第 0 周时接受随机化的受试者)



在 VOYAGE 1 中，对于接受连续古塞奇尤单抗治疗的受试者，从第 52 周至第 252 周的 PASI 90 应答率保持不变。对于第 0 周时随机化至阿达木单抗组且第 52 周时交叉至古塞奇尤单抗组的受试者，从第 52 周至第 76 周 PASI 90 应答率增加，之后维持至第 252 周 (见图 2)。

图 2: VOYAGE 1 开放期访视时获得 PASI 90 应答的受试者百分比



无论年龄、性别、人种、体重、斑块位置、基线 PASI 严重程度、是否并发银屑病关节炎以及既往是否接受过生物治疗，古塞奇尤单抗均显示出疗效和安全性。古塞奇尤单抗对于未使用过常规系统性治疗、未使用过生物治疗以及使用过生物治疗的受试者均有效。

在 VOYAGE 2 中，第 48 周时接受古塞奇尤单抗维持治疗的受试者中有 88.6% 为 PASI 90 应答者，而第 28 周时退出治疗的受试者中有 36.8% 为 PASI 90 应答者 ( $p < 0.001$ )。早在古塞奇尤单抗停药后 4 周就观察到 PASI 90 失应答，至 PASI 90 失应答的中位时间约为 15 周。在退出治疗随后再次开始古塞奇尤单抗治疗的受试者中，开始再次治疗 20 周后，80% 的受试者重新获得 PASI 90 应答。

在 VOYAGE 2 中，在随机化至阿达木单抗组且第 28 周时未能达到 PASI 90 应答的 112 例受试者中，分别有 66% 和 76% 的受试者在接受古塞奇尤单抗治疗 20 周和 44 周后达到 PASI 90 应答。此外，在随机化至古塞奇尤单抗组且第 28 周时未能达到 PASI 90 应答的 95 例受试者中，分别有 36% 和 41% 的受试者在继续接受额外的 20 周和 44 周古塞奇尤单抗治疗后达到了 PASI 90 应答。在从阿达木单抗转换到古塞奇尤单抗治疗的受试者中，未观察到新的安全性问题。



局部疾病

在 VOYAGE 1 和 2 中，第 16 周时，相较于接受安慰剂治疗的受试者，接受古塞奇尤单抗治疗的受试者的头皮、手足和指甲银屑病显著改善（分别通过头皮特异性研究者总体评估[ss-IGA]、医生对手部和/或足部的总体评估[hf-PGA]、医生对指甲的总体评估[f-PGA]、指甲银屑病严重程度指数[NAPSI]测量）( $p < 0.001$ , 表 4)。在第 24 周（VOYAGE 1 和 2）和第 48 周（VOYAGE 1）时，古塞奇尤单抗与阿达木单抗相比在头皮和手足银屑病方面显示出优效性（ $p \leq 0.001$ , 第 24 周[VOYAGE 2]和第 48 周[VOYAGE 1]的手足银屑病除外， $p < 0.05$ ）。

**表 4: VOYAGE 1 和 VOYAGE 2 局部疾病应答总结**

	VOYAGE 1			VOYAGE 2		
	安慰剂组	古塞奇尤单抗	阿达木单抗	安慰剂组	古塞奇尤单抗	阿达木单抗
<b>ss-IGA (N)<sup>a</sup></b>	145	277	286	202	408	194
ss-IGA 0/1 <sup>b</sup> , n (%)						
16 周	21 (14.5)	231 (83.4) <sup>c</sup>	201 (70.3) <sup>d</sup>	22 (10.9)	329 (80.6) <sup>c</sup>	130 (67.0) <sup>d</sup>
<b>hf-PGA (N)<sup>a</sup></b>	43	90	95	63	114	56
hf-PGA 0/1 <sup>b</sup> , n (%)						
16 周	6 (14.0)	66 (73.3) <sup>e</sup>	53 (55.8) <sup>d</sup>	9 (14.3)	88 (77.2) <sup>e</sup>	40 (71.4) <sup>d</sup>
<b>f-PGA (N)<sup>a</sup></b>	88	174	173	123	246	124
f-PGA 0/1, n (%)						
16 周	14 (15.9)	68 (39.1) <sup>e</sup>	88 (50.9) <sup>d</sup>	18 (14.6)	128 (52.0) <sup>e</sup>	74 (59.7) <sup>d</sup>
<b>NAPSI (N)<sup>a</sup></b>	99	194	191	140	280	140
百分比改善, 均值 (SD)						
16 周	-0.9 (57.9)	34.4 (42.4) <sup>e</sup>	38.0 (53.9) <sup>d</sup>	1.8 (53.8)	39.6 (45.6) <sup>e</sup>	46.9 (48.1) <sup>d</sup>

<sup>a</sup> 仅包括基线时 ss-IGA、f-PGA、hf-PGA 得分  $\geq 2$  的受试者或基线 NAPSI 评分  $> 0$  的受试者。

<sup>b</sup> 仅包括 ss-IGA 和/或 hf-PGA 较基线改善  $\geq 2$  级的受试者。

<sup>c</sup> 古塞奇尤单抗和安慰剂之间重要次要终点比较的  $p$  值  $< 0.001$ 。

<sup>d</sup> 未进行古塞奇尤单抗和阿达木单抗之间的比较。

<sup>e</sup> 古塞奇尤单抗与安慰剂之间比较的  $p$  值  $< 0.001$ 。

健康相关生活质量/受试者报告结局

在 VOYAGE 1 和 2 中，观察到在第 16 周时，相较于安慰剂组受试者，古塞奇尤单抗组受试者的健康相关生活质量（通过皮肤病生活质量指数[DLQI]测量）和受试者报告银屑病症状（发痒、疼痛、烧灼感、刺痛和皮肤紧缩感）和体征（皮肤干燥、破裂、鳞屑、脱落或脱屑、发红和流血）（通过银屑病症状与体征日记评估）显著改善（表 5）。依据受试者报告结局，症状改善一直保持到第 24 周（VOYAGE 1 和 2）和第 48 周（VOYAGE 1）。在 VOYAGE 1 中，对于接受连续古塞奇尤单抗治疗的受试者，这些改善在开放期持续至第 252 周（表 6）。

**表 5：第 16 周 VOYAGE 1 和 VOYAGE 2 中受试者报告结局的总结**

	<u>VOYAGE 1</u>			<u>VOYAGE 2</u>		
	安慰剂组	古塞奇尤单抗	阿达木单抗	安慰剂组	古塞奇尤单抗	阿达木单抗
<b>DLQI</b> ，有基线评分的受试者	170	322	328	248	495	247
较基线变化，均值（标准差）。						
16 周	-0.6 (6.4)	-11.2 (7.2) <sup>c</sup>	-9.3 (7.8) <sup>b</sup>	-2.6 (6.9)	-11.3 (6.8) <sup>c</sup>	-9.7 (6.8) <sup>b</sup>
<b>PSSD 症状评分</b> ，基线评分 >0 的受试者	129	248	273	198	410	200
症状评分 = 0，n (%)						
16 周	1 (0.8)	67 (27.0) <sup>a</sup>	45 (16.5) <sup>b</sup>	0	112 (27.3) <sup>a</sup>	30 (15.0) <sup>b</sup>
<b>PSSD 体征评分</b> ，基线评分 >0 的受试者	129	248	274	198	411	201
体征评分 = 0，n (%)						
16 周	0	50 (20.2) <sup>a</sup>	32 (11.7) <sup>b</sup>	0	86 (20.9) <sup>a</sup>	21 (10.4) <sup>b</sup>

<sup>a</sup> 古塞奇尤单抗与安慰剂之间比较的 p 值 < 0.001。

<sup>b</sup> 未进行古塞奇尤单抗和阿达木单抗之间的比较。

<sup>c</sup> 古塞奇尤单抗与安慰剂之间重要次要终点比较的 p 值 < 0.001。

**表 6: VOYAGE 1 开放期受试者报告结果总结**

	古塞奇尤单抗 <sup>a</sup>			阿达木单抗-古塞奇尤单抗 <sup>b</sup>		
	第 76 周	第 156 周	第 252 周	第 76 周	第 156 周	第 252 周
基线时 DLQI 评分>1, n	445	420	374	264	255	235
DLQI 0/1 的受试者	337 (75.7%)	308 (73.3%)	272 (72.7%)	198 (75.0%)	190 (74.5%)	174 (74.0%)
PSSD 症状评分, 基线评分>0 的受试者	347	327	297	227	218	200
症状评分=0, n (%)	136 (39.2%)	130 (39.8%)	126 (42.4%)	99 (43.6%)	96 (44.0%)	96 (48.0%)
PSSD 体征评分, 基线评分>0 的受试者	347	327	297	228	219	201
体征评分=0, n (%)	102 (29.4%)	94 (28.7%)	98 (33.0%)	71 (31.1%)	69 (31.5%)	76 (37.8%)

在 VOYAGE 2 中, 第 16 周时, 古塞奇尤单抗组受试者的健康相关生活质量、焦虑和抑郁以及工作限制指标 (分别通过 36 项健康调查简表[SF-36]、医院焦虑抑郁量表[HADS]和工作限制问卷[WLQ]评估) 较基线的改善显著大于安慰剂组。在第 28 周时被随机分配至接受维持治疗的受试者中, SF 36、HADS 和 WLQ 的改善一直维持至第 48 周且开放期持续至第 252 周。


#### NAVIGATE

NAVIGATE 研究在第 16 周对乌司奴单抗应答不足 (即, 未达到“清除”或“极轻度”应答, 定义为 IGA  $\geq 2$ ) 的受试者中评估了古塞奇尤单抗的疗效。所有受试者 (N=871) 在第 0 周和第 4 周接受开放性乌司奴单抗治疗 (45 mg  $\leq$  100 kg 和 90 mg  $>$  100 kg)。在第 16 周时, 268 例 IGA 评分  $\geq 2$  的受试者被随机分配至继续乌司奴单抗治疗 (N=133), 每 12 周一次, 或开始在第 16 周和第 20 周进行古塞奇尤单抗治疗 (N=135), 之后每 8 周一次。随机化受试者的基线特征与在 VOYAGE 1 和 2 中观察到的特征相似。

随机化之后, 主要终点是随机化后第 12 周和第 24 周之间受试者 IGA 评分达到 0/1 以及改善  $\geq 2$  级的访视次数。每四周对受试者进行一次检查, 共访视四次。在随机化时对乌司奴单抗应答不足的受试者中, 转换至古塞奇尤单抗治疗的受试者的疗效改善情况显著优于继续乌司奴单抗治疗的受试者。随机化后 12-24 周, 古塞奇尤单抗组受试者 IGA 评分达到 0/1 以及改善  $\geq 2$  级的访视次数是乌司奴单抗组受试者 IGA 评分达到 0/1 以及改善  $\geq 2$  级的访视次数的 2 倍 (访视次数均值分别为 1.5 vs 0.7,  $p < 0.001$ )。此外, 随机化后 12 周, 古塞奇尤单抗组达到 IGA 评分 0/1 且  $\geq 2$  级改善 (分别为 31.1%和

14.3%； $p=0.001$ ) 和 PASI 90 应答 (分别为 48%和 23%， $p<0.001$ ) 的受试者比例高于乌司奴单抗组。早在随机化后 4 周就观察到古塞奇尤单抗和乌司奴单抗治疗受试者之间的应答率存在差异 (分别为 11.1%和 9.0%)，并且在随机化后 24 周达到最大值 (见图 3)。在从乌司奴单抗转换为古塞奇尤单抗的受试者中，未观察到新的安全性问题。

**图 3:** 根据访视总结的、从随机化后第 0 周至第 24 周 NAVIGATE 中达到 IGA 评分清除 (0) 或极轻度 (1) 以及 IGA 改善至少为 2 级的受试者百分比



### ECLIPSE

在一项双盲研究中也比较了古塞奇尤单抗与司库奇尤单抗的疗效和安全性。受试者随机接受古塞奇尤单抗 (N=534；第 0、4 周时 100 mg，之后每 8 周一次) 或司库奇尤单抗 (N=514；第 0、1、2、3、4 周时 300 mg，之后每 4 周一次) 治疗。两个治疗组的末次给药时间均为第 44 周。

受试者的基线疾病特征与中重度斑块状银屑病人群一致，中位 BSA 为 20%，中位 PASI 评分为 18，24%受试者 IGA 评分为重度。

根据主要终点即第 48 周时 PASI 90 应答，古塞奇尤单抗优效于司库奇尤单抗 (84.5% vs 70.0%， $p<0.001$ )。PASI 应答率比较见表 7。

**表 7: ECLIPSE 中的 PASI 应答率**

	受试者例数 (%)	
	古塞奇尤单抗组 (N=534)	司库奇尤单抗 (N=514)
<b>主要终点</b>		
第 48 周时的 PASI 90 应答	451 (84.5%) <sup>a</sup>	360 (70.0%)
<b>关键次要终点</b>		
第 12 周和第 48 周时的 PASI 75 应答	452 (84.6%) <sup>b</sup>	412 (80.2%)
第 12 周时 PASI 75 应答	477 (89.3%) <sup>c</sup>	471 (91.6%)
第 12 周时 PASI 90 应答	369 (69.1%) <sup>c</sup>	391 (76.1%)
第 48 周时 PASI 100 应答	311 (58.2%) <sup>c</sup>	249 (48.4%)


<sup>a</sup> 优效性  $p < 0.001$

<sup>b</sup> 非劣效性  $p < 0.001$ , 优效性  $p = 0.062$

<sup>c</sup> 不作正式的统计检验。

至 48 周的古塞奇尤单抗和司库奇尤单抗 PASI 90 应答率见图 4。

**图 4: ECLIPSE 研究中根据访视总结的、至第 48 周达到 PASI 90 应答的受试者百分比 (第 0 周时接受随机化的受试者)**



## 克罗恩病

在两项 III 期研究（GALAXI 2 和 GALAXI 3）中评价了古塞奇尤单抗治疗对皮质类固醇、传统免疫调节剂（AZA、6-MP、MTX）和/或生物制剂治疗（TNF 抑制剂或维得利珠单抗）应答不足、失应答或不耐受的中重度活动性克罗恩病成人受试者的疗效和安全性。这两项研究设计完全相同：48 周多中心、随机、双盲、安慰剂和活性对照（乌司奴单抗）、平行组研究（静脉诱导治疗和皮下[SC]维持治疗）。这两项研究均采用持续治疗设计：被随机分配至古塞奇尤单抗治疗组的受试者在研究期间始终维持该治疗分配。

在 GALAXI 2 和 GALAXI 3 研究中，中重度活动性克罗恩病定义为克罗恩病活动指数（CAI）评分 $\geq 220$ 分且 $\leq 450$ 分，CD 简化内镜评分（SES-CD） $\geq 6$ 分（或对于孤立性回肠疾病受试者为 $\geq 4$ 分）。

在 GALAXI 2 和 GALAXI 3 研究中，将受试者按照 2:2:2:1 的比例随机分配至以下治疗组之一：第 0、4 和 8 周古塞奇尤单抗 200 mg 静脉诱导给药，之后古塞奇尤单抗 200 mg 每 4 周一次皮下维持给药；或第 0、4 和 8 周古塞奇尤单抗 200 mg 静脉诱导给药，之后古塞奇尤单抗 100 mg 每 8 周一次皮下维持给药；或乌司奴单抗；或安慰剂。安慰剂无应答者从第 12 周开始接受乌司奴单抗治疗。

GALAXI 2（N=508）和 GALAXI 3（N=513）共计评价了 1021 例受试者。中位年龄为 34 岁（范围：18-83 岁），42.4%为女性；74.3%为白人，21.3%为亚洲人，1.5%为黑人或非裔美国人。

在 GALAXI 2 和 GALAXI 3 中，分别有 52.8%和 51.9%的受试者有既往至少一种生物制剂治疗失败史，41.9%和 41.5%的受试者未接受过生物制剂治疗，5.3%和 6.6%的受试者既往接受过生物制剂治疗但未失败。基线时，37.4%和 36.1%的受试者正在接受口服皮质类固醇，29.9%和 30.2%的受试者正在接受传统免疫调节剂。

在 GALAXI 2 和 GALAXI 3 中，复合共同主要终点为与安慰剂比较的（1）第 12 周临床应答且第 48 周临床缓解以及（2）第 12 周临床应答且第 48 周内镜应答（表 8）。次要终点包括与安慰剂短期比较（第 12 周）以及与安慰剂长期比较（至第 48 周）的临床和内镜结局（表 9 和表 10）。对于 GALAXI 2 和 GALAXI 3 的复合终点，同一受试者必须达到终点的两个分项。

表8: GALAXI 2和GALAXI 3中达到共同主要疗效终点的受试者比例

GALAXI 2					
终点	安慰剂 (N=76)	古塞奇尤单抗 静脉诱导给药 →100 mg q8w 皮下注射 <sup>a</sup> (N=143)	古塞奇尤单抗 静脉诱导给药 →200 mg q4w 皮下注射 <sup>b</sup> (N=146)	治疗差异 vs 安慰剂 (95% CI) <sup>c</sup>	
				古塞奇尤 单抗100 mg	古塞奇尤 单抗200 mg
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的临床缓解<sup>e</sup></b>					
总人群	9 (12%)	70 (49%)	80 (55%)	38% (27%, 49%) <sup>f</sup>	43% (32%, 54%) <sup>f</sup>
未接受过生物制剂 治疗 <sup>g</sup>	3/34 (9%)	35/58 (60%)	37/63 (59%)		
既往生物制剂治疗 失败 <sup>h</sup>	5/39 (13%)	30/77 (39%)	38/73 (52%)		
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的内镜应答<sup>i</sup></b>					
总人群	4 (5%)	56 (39%)	56 (38%)	34% (24%, 43%) <sup>f</sup>	33% (24%, 42%) <sup>f</sup>
未接受过生物制剂 治疗 <sup>g</sup>	2/34 (6%)	26/58 (45%)	31/63 (49%)		
既往生物制剂治疗 失败 <sup>h</sup>	2/39 (5%)	28/77 (36%)	19/73 (26%)		

表8: GALAXI 2和GALAXI 3中达到共同主要疗效终点的受试者比例

GALAXI 3					
终点	安慰剂 (N=72)	古塞奇尤单抗 静脉诱导给药 →100 mg q8w 皮下注射 <sup>a</sup> (N=143)	古塞奇尤单抗 静脉诱导给药 →200 mg q4w 皮下注射 <sup>b</sup> (N=150)	治疗差异 vs 安慰剂 (95% CI) <sup>c</sup>	
				古塞奇尤 单抗100 mg	古塞奇尤 单抗200 mg
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的临床缓解<sup>e</sup></b>					
总人群	9 (13%)	67 (47%)	72 (48%)	34% (23%, 45%) <sup>f</sup>	35% (24%, 46%) <sup>f</sup>
未接受过生物制剂 治疗 <sup>g</sup>	4/27 (15%)	25/58 (43%)	33/65 (51%)		
既往生物制剂治疗 失败 <sup>h</sup>	5/39 (13%)	40/76 (53%)	35/74 (47%)		
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的内镜应答<sup>i</sup></b>					
总人群	4 (6%)	48 (34%)	54 (36%)	28% (19%, 37%) <sup>f</sup>	31% (21%, 40%) <sup>f</sup>
未接受过生物制剂 治疗 <sup>g</sup>	2/27 (7%)	21/58 (36%)	25/65 (38%)		
既往生物制剂治疗 失败 <sup>h</sup>	2/39 (5%)	27/76 (36%)	27/74 (36%)		

<sup>a</sup> 第0、4和8周时古塞奇尤单抗200 mg静脉输注给药，之后古塞奇尤单抗100 mg每8周一次皮下注射给药，长达48周。

<sup>b</sup> 第0、4和8周时古塞奇尤单抗200 mg静脉输注给药，之后古塞奇尤单抗200 mg每4周一次皮下注射给药，长达48周。

<sup>c</sup> 使用Mantel-Haenszel分层权重和Sato方差估计值得出基于共同风险差异的校正治疗差异和CI。使用的分层变量为基线CDAI评分（≤300分或>300分）、基线SES-CD评分（≤12分或>12分）、BIO-失败状态（是或否）和基线皮质类固醇使用情况（是或否）。CI=置信区间

<sup>d</sup> 临床应答定义为CDAI评分较基线降低≥100分或CDAI评分<150分。

<sup>e</sup> 临床缓解定义为CDAI评分<150分。

<sup>f</sup> p<0.001。

<sup>g</sup> 另有9例安慰剂组受试者、17例古塞奇尤单抗100 mg SC q8w治疗组受试者和21例古塞奇尤单抗200 mg SC q4w治疗组受试者既往接受过生物制剂治疗但未失败。

<sup>h</sup> 包括对克罗恩病生物制剂治疗（TNF抑制剂或维得利珠单抗）应答不足、失应答或不耐受。

<sup>i</sup> 内镜应答定义为SES-CD评分较基线改善≥50%或SES-CD评分≤2分。



**表9: GALAXI 2和GALAXI 3中达到短期疗效终点的受试者比例**

<b>GALAXI 2</b>			
<b>终点</b>	<b>安慰剂 (N=76)</b>	<b>古塞奇尤单抗静 脉诱导给药<sup>a</sup> (N=289)</b>	<b>治疗差异 vs 安慰剂 (95% CI) <sup>b</sup></b>
<b>第12周时的临床缓解<sup>c</sup></b>			
总人群	17 (22%)	136 (47%)	25% (14%, 36%) <sup>d</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	6/34 (18%)	60/121 (50%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	9/39 (23%)	67/150 (45%)	
<b>第12周时的内镜应答<sup>g</sup></b>			
总人群	8 (11%)	109 (38%)	28% (19%, 36%) <sup>d</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	5/34 (15%)	62/121 (51%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	2/39 (5%)	40/150 (27%)	
<b>第12周时的疲劳应答<sup>h</sup></b>			
总人群	22 (29%)	131 (45%)	16% (5%, 28%) <sup>i</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	11/34 (32%)	58/121 (48%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	10/39 (26%)	62/150 (41%)	
<b>第12周时的临床缓解<sup>c</sup>且第12周时的内镜应答<sup>g</sup></b>			
总人群	3 (4%)	62 (21%)	18% (11%, 24%) <sup>d</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	0/34	36/121 (30%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	2/39 (5%)	22/150 (15%)	

**表9: GALAXI 2和GALAXI 3中达到短期疗效终点的受试者比例**

<b>GALAXI 3</b>			
<b>终点</b>	<b>安慰剂 (N=72)</b>	<b>古塞奇尤单抗静脉 诱导给药<sup>a</sup> (N=293)</b>	<b>治疗差异 vs 安慰剂 (95% CI)<sup>b</sup></b>
<b>第12周时的临床缓解<sup>c</sup></b>			
总人群	11 (15%)	138 (47%)	31% (21%, 41%) <sup>d</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	4/27 (15%)	61/123 (50%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	6/39 (15%)	71/150 (47%)	
<b>第12周时的内镜应答<sup>g</sup></b>			
总人群	10 (14%)	106 (36%)	22% (12%, 32%) <sup>d</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	6/27 (22%)	51/123 (41%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	3/39 (8%)	47/150 (31%)	
<b>第12周时的疲劳应答<sup>h</sup></b>			
总人群	13 (18%)	127 (43%)	26% (15%, 36%) <sup>d</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	5/27 (19%)	56/123 (46%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	7/39 (18%)	64/150 (43%)	
<b>第12周时的临床缓解<sup>c</sup>且第12周时的内镜应答<sup>g</sup></b>			
总人群	2 (3%)	64 (22%)	19% (12%, 25%) <sup>d</sup>
未接受过生物制剂治疗 <sup>e</sup>	1/27 (4%)	33/123 (27%)	
既往生物制剂治疗失败 <sup>f</sup>	1/39 (3%)	29/150 (19%)	

<sup>a</sup> 第0、4和8周时古塞奇尤单抗200 mg静脉输注给药。在该列中将两个古塞奇尤单抗治疗组进行了合并，因为这两组受试者接受了相同的治疗。

<sup>b</sup> 使用Mantel-Haenszel分层权重和Sato方差估计值得出基于共同风险差异的校正治疗差异和CI。使用的分层变量为基线CDAI评分（≤300分或>300分）、基线SES-CD评分（≤12分或>12分）、BIO-失败状态（是或否）和基线皮质类固醇使用情况（是或否）。CI=置信区间。

<sup>c</sup> 临床缓解定义为CDAI评分<150分。

<sup>d</sup> p<0.001。

<sup>e</sup> 另有9例安慰剂组受试者和38例古塞奇尤单抗200 mg静脉给药组受试者之前接受过生物制剂治疗但未失败。

<sup>f</sup> 包括对克罗恩病生物制剂治疗（TNF抑制剂或维得利珠单抗）应答不足、失应答或不耐受。

<sup>g</sup> 内镜应答定义为SES-CD评分较基线改善≥50%或SES-CD评分≤2分。

<sup>h</sup> 疲劳应答定义为PROMIS疲劳简表7a评分的改善≥7分。

<sup>i</sup> p<0.05。

在 GALAXI 2 和 GALAXI 3 中，古塞奇尤单抗 200 mg 静脉诱导治疗组中达到第 4 周临床应答（通过 CDAI 评估）以及达到第 12 周内镜缓解的受试者比例高于安慰剂组。

表10: GALAXI 2和GALAXI 3中达到长期疗效终点的受试者比例

GALAXI 2					
终点	安慰剂 (N=76)	古塞奇尤单 抗静脉诱导 给药→100 mg q8w皮 下注射 <sup>a</sup> (N=143)	古塞奇尤单 抗静脉诱导 给药→200 mg q4w皮下 注射 <sup>b</sup> (N=146)	治疗差异 vs 安慰剂 (95% CI) <sup>c</sup>	
				古塞奇尤单 抗100 mg	古塞奇尤单抗 200 mg
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的无皮质类固醇临床缓解<sup>e</sup></b>					
总人群	7 (9%)	67 (47%)	74 (51%)	39% (28%, 49%) <sup>f</sup>	41% (31%, 52%) <sup>f</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>g</sup>	2/34 (6%)	34/58 (59%)	33/63 (52%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>h</sup>	4/39 (10%)	28/77 (36%)	36/73 (49%)		
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的内镜缓解<sup>i</sup></b>					
总人群	2 (3%)	38 (27%)	48 (33%)	24% (16%, 32%) <sup>f</sup>	30% (21%, 39%) <sup>f</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>g</sup>	1/34 (3%)	19/58 (33%)	27/63 (43%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>h</sup>	1/39 (3%)	19/77 (25%)	15/73 (21%)		

表10: GALAXI 2和GALAXI 3中达到长期疗效终点的受试者比例

GALAXI 3					
终点	安慰剂 (N=72)	古塞奇尤单 抗静脉诱导 给药→100 mg q8w皮 下注射 <sup>a</sup> (N=143)	古塞奇尤单 抗静脉诱导 给药→200 mg q4w皮下 注射 <sup>b</sup> (N=150)	治疗差异 vs 安慰剂 (95% CI) <sup>c</sup>	
				古塞奇尤单 抗100 mg	古塞奇尤单 抗200 mg
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的无皮质类固醇临床缓解<sup>e</sup></b>					
总人群	9 (13%)	65 (45%)	67 (45%)	33% (22%, 44%) <sup>f</sup>	31% (20%, 43%) <sup>f</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>g</sup>	4/27 (15%)	23/58 (40%)	30/65 (46%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>h</sup>	5/39 (13%)	40/76 (53%)	33/74 (45%)		
<b>第12周时的临床应答<sup>d</sup>且第48周时的内镜缓解<sup>i</sup></b>					
总人群	4 (6%)	34 (24%)	34 (23%)	18% (10%, 27%) <sup>f</sup>	17% (8%, 25%) <sup>f</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>g</sup>	2/27 (7%)	15/58 (26%)	19/65 (29%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>h</sup>	2/39 (5%)	19/76 (25%)	14/74 (19%)		

<sup>a</sup> 第0、4和8周时古塞奇尤单抗200 mg静脉输注给药，之后古塞奇尤单抗100 mg每8周一次皮下注射给药，长达48周。

<sup>b</sup> 第0、4和8周时古塞奇尤单抗200 mg静脉输注给药，之后古塞奇尤单抗200 mg每4周一次皮下注射给药，长达48周。

<sup>c</sup> 使用Mantel-Haenszel分层权重和Sato方差估计值得出基于共同风险差异的校正治疗差异和CI。使用的分层变量为基线CDAI评分（≤300分或>300分）、基线SES-CD评分（≤12分或>12分）、BIO-失败状态（是或否）和基线皮质类固醇使用情况（是或否）。CI=置信区间。

<sup>d</sup> 临床应答定义为CDAI评分较基线降低≥100分或CDAI评分<150分。

<sup>e</sup> 90天无皮质类固醇临床缓解定义为CDAI评分<150分且在相关访视前至少90天未接受皮质类固醇治疗。

<sup>f</sup> p<0.001。

<sup>g</sup> 另有9例安慰剂组受试者、21例古塞奇尤单抗200 mg SC q4w治疗组受试者和17例古塞奇尤单抗100 mg SC q8w治疗组受试者既往接受过生物制剂治疗但未失败。

<sup>h</sup> 包括对克罗恩病生物制剂治疗（TNF抑制剂或维得利珠单抗）应答不足、失应答或不耐受。

<sup>i</sup> 内镜缓解（全球定义）定义为SES-CD≤4分，且较基线降低≥2分，且所有单个分项评分均≤1分。

基于合并的 GALAXI 2 和 GALAXI 3 研究数据（包括未接受过生物制剂治疗和既往生物制剂治疗失败亚组人群），两个古塞奇尤单抗维持治疗组与乌司奴单抗相比第 48 周时的长期疗效终点结果见表 11。

**表11：合并的GALAXI 2和GALAXI 3中与乌司奴单抗相比达到长期疗效终点受试者比例**

合并的GALAXI 2和GALAXI 3					
终点	乌司奴单抗 ~6 mg/kg 静 脉诱导给药 →90 mg q8w 皮下注射 <sup>a</sup> (N=291)	古塞奇尤单 抗静脉诱导 给药→ 100 mg q8w 皮下注射 <sup>b</sup> (N=286)	古塞奇尤单 抗静脉诱导 给药⇒ 200 mg q4w 皮下注射 <sup>c</sup> (N=296)	治疗差异 vs 乌司奴单抗 (95% CI) <sup>d</sup>	
				古塞奇尤单 抗 100 mg	古塞奇尤单 抗 200 mg
<b>第48周时的内镜应答<sup>e</sup></b>					
总人群	108 (37%)	137 (48%)	156 (53%)	11% (3%, 18%) <sup>f</sup>	16% (8%, 23%) <sup>g</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>h</sup>	52/121 (43%)	68/116 (59%)	76/128 (59%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>i</sup>	49/156 (31%)	66/153 (43%)	69/147 (47%)		
<b>第48周时的内镜缓解<sup>j</sup></b>					
总人群	72 (25%)	95 (33%)	110 (37%)	8% (1%, 16%) <sup>f</sup>	12% (5%, 20%) <sup>f</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>h</sup>	36/121 (30%)	51/116 (44%)	59/128 (46%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>i</sup>	32/156 (21%)	43/153 (28%)	42/147 (29%)		
<b>第48周时的深度缓解<sup>k</sup></b>					
总人群	65 (22%)	85 (30%)	100 (34%)	7% (0%, 15%) <sup>f</sup>	11% (4%, 19%) <sup>f</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>h</sup>	35/121 (29%)	45/116 (39%)	56/128 (44%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>i</sup>	27/156 (17%)	39/153 (25%)	36/147 (24%)		
<b>第48周时的临床缓解<sup>l</sup>且第48周时的内镜应答<sup>e</sup></b>					
总人群	98 (34%)	119 (42%)	140 (47%)	8% (0%, 16%) <sup>f</sup>	14% (6%, 21%) <sup>g</sup>
未接受过生物 制剂治疗 <sup>h</sup>	52/121 (43%)	59/116 (51%)	70/128 (55%)		
既往生物制剂 治疗失败 <sup>i</sup>	40/156 (26%)	57/153 (37%)	60/147 (41%)		

**表11: 合并的GALAXI 2和GALAXI 3中与乌司奴单抗相比达到长期疗效终点受试者比例**

- 
- a 第0周时乌司奴单抗约 6 mg/kg 静脉诱导给药, 之后乌司奴单抗 90 mg 每 8 周一次皮下注射给药, 长达 48 周。
- b 第0、4和8周时古塞奇尤单抗200 mg静脉输注给药, 之后古塞奇尤单抗100 mg每8周一次皮下注射给药, 长达48周。
- c 第0、4和8周时古塞奇尤单抗200 mg静脉输注给药, 之后古塞奇尤单抗200 mg每4周一次皮下注射给药, 长达48周。
- d 使用Mantel-Haenszel分层权重和Sato方差估计值得出基于共同风险差异的校正治疗差异和CI。使用的分层变量为基线CDAI评分 ( $\leq 300$ 分或 $> 300$ 分)、基线SES-CD评分 ( $\leq 12$ 分或 $> 12$ 分)、BIO-失败状态 (是或否) 和基线皮质类固醇使用情况 (是或否)。CI=置信区间。
- e 内镜应答定义为SES-CD评分较基线改善 $\geq 50\%$ 或SES-CD评分 $\leq 2$ 分。
- f  $p < 0.05$ 。
- g  $p < 0.001$ 。
- h 另有14例乌司奴单抗组受试者、21例古塞奇尤单抗200 mg SC q4w治疗组受试者和17例古塞奇尤单抗100 mg SC q8w治疗组受试者既往接受过生物制剂治疗但未失败。
- i 包括对克罗恩病生物制剂治疗 (TNF抑制剂或维得利珠单抗) 应答不足、失应答或不耐受。
- j 内镜缓解 (全球定义) 定义为SES-CD $\leq 4$ 分, 且较基线降低 $\geq 2$ 分, 且所有单个分项评分均 $\leq 1$ 分。
- k 深度缓解定义为同时达到临床缓解和内镜缓解。
- l 临床缓解定义为CDAI评分 $< 150$ 分。

在 GALAXI 2 和 GALAXI 3 中, 古塞奇尤单抗的疗效和安全性在不同年龄、性别、人种、体重中均得到证实。古塞奇尤单抗对未接受过生物制剂治疗以及既往生物制剂治疗失败的受试者均有效。

### **排便次数和腹痛**

在接受古塞奇尤单抗 200mg 静脉治疗的受试者中, 早在第 4 周就观察到排便次数和腹痛单项评分降低的受试者比例高于安慰剂组, 并且在两个古塞奇尤单抗维持治疗组中均观察到改善持续至第 48 周。

### **其他健康相关结局**

使用患者报告结果测量信息系统 (PROMIS) -疲劳量表-7a (PROMIS-疲劳 SF-7a) 评估 GALAXI 2 和 GALAXI 3 中的疲劳。在 GALAXI 2 和 GALAXI 3 试验中, 与安慰剂组相比, 古塞奇尤单抗 200 mg 静脉治疗组的受试者在第 12 周疲劳应答 (根据 PROMIS 疲劳量表 SF-7a 评估) 有显著提升且有临床意义的改善 ( $\geq 7$  分) (GALAXI 2: 45% vs 29%,  $p < 0.05$ ; GALAXI 3: 43% vs 18%,  $p < 0.001$ ), 并且疲劳应答改善持续至第 48 周。

## 【药理毒理】

### 药理作用

古塞奇尤单抗是一种人源单克隆 IgG1  $\lambda$  抗体，可选择性结合白介素 23 (IL-23) 的 p19 亚单位并抑制其与 IL-23 受体的相互作用。IL-23 是一种天然存在的细胞因子，参与正常的炎症和免疫反应。古塞奇尤单抗抑制促炎细胞因子和趋化因子的释放。

体外研究中，古塞奇尤单抗可通过 CD64 与炎性单核细胞结合，并捕获其释放的 IL-23。

### 毒理研究

#### 生殖毒性

雄性豚鼠每周 2 次皮下给予古塞奇尤单抗 25 mg/kg（相当于人静脉给药 200 mg 后暴露量[AUC]的 6 倍和皮下给药 200 mg 后暴露量[AUC]的 10 倍），未见对生育力参数的影响。雌性豚鼠每周 2 次皮下给予古塞奇尤单抗 100 mg/kg（相当于人静脉给药 200 mg 后暴露量[AUC]的 12 倍和皮下给药 200 mg 后暴露量[AUC]的 21 倍），未见到对生育力参数的影响。

在胚胎-胎崽发育毒性及围产期发育毒性联合研究中，妊娠食蟹猴从器官发生期至分娩期间每周皮下给予古塞奇尤单抗，对照组 1 只，10 mg/kg 和 50 mg/kg 组（分别相当于人静脉给药 200 mg 后暴露量[AUC]的 4、18 倍，皮下给药 200 mg 后暴露量[AUC]的 7、32 倍）各有 3 只动物的新生崽死亡。这些结果的临床意义尚不明确。猴幼崽从出生到 6 月龄期间，未见与古塞奇尤单抗相关的功能发育或免疫发育的影响。

产后第 28 天的母体食蟹猴乳汁中未检测到古塞奇尤单抗。

## 【贮藏】

2~8°C 避光贮存。

## 【包装】

古塞奇尤单抗 100 mg 注射液，预充式注射器装。

装 1 mL 溶液的预充式玻璃注射器，配固定针头和针头罩，装有自动针头保护套。

1 支/盒（预充式注射器）。

**【有效期】**

24 个月

**【执行标准】**

药品注册标准号：JS20240016

**【批准文号】**

国药准字 SJ20190044

**【上市许可持有人】**

名称：Janssen-Cilag International NV

注册地址：Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, 比利时

**【生产企业】**

企业名称：Cilag AG

生产地址：Hochstrasse 201, 8200 Schaffhausen, 瑞士

**【境内责任人/境内联系人】**

名称：西安杨森制药有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号，陕西省西安市高新区高新五路 4 号汇诚国际 17F

邮政编码：710304

电话号码：400 888 9988

传真号码：(029) 8257 6616

网址：<http://www.xian-janssen.com.cn>



## 使用指南

### 古塞奇尤单抗

### 预充式注射器



一次性使用器械

### 重要事项

如果您的医生决定可由您或您的看护者在家注射古塞奇尤单抗，您应该接受培训，了解在注射前如何使用预充式注射器正确制备和注射古塞奇尤单抗。

请在使用古塞奇尤单抗预充式注射器前以及每次获得新一瓶本品时，阅读本使用指南。因为可能会有新信息。此使用指南不能替代您与医生关于您的医疗情况或治疗的谈话。开始注射前，也请仔细阅读包装说明书，并与医生或护士讨论您可能存在的任何问题。

古塞奇尤单抗预充式注射器适用于皮下注射，不适用于肌肉或静脉注射。注射后，针头可缩回到注射装置内，并固定住。



### 储存信息


在 2°C-8°C 的冰箱中储存。不要冷冻。

请将本品和其它药品放在儿童无法接触的地方。


任何时候都不要振摇预充式注射器。

### 目视检查预充式注射器

注射前




注射后



**您将需要以下物品：**

- 1个酒精棉签
- 1个棉球或纱布
- 1个创可贴
- 1个锐利物品收集盒（见步骤3）

## 1. 注射准备



### 检查纸盒

从冰箱中取出装有预充式注射器的包装盒。

将预充式注射器置于包装盒中，使用前在室温下放在平面上至少 **30 分钟**。

**请勿**以任何其他方式进行加热。

检查纸盒后面的有效期（“EXP”）。

如超过有效期，**请勿**使用。

如果纸盒上的穿孔破损，**不要**注射。

如需续药，请联系您的医生或药剂师。



### 选择注射部位

选择以下部位进行注射：

- 大腿前部（推荐）


- 下腹部

不要在肚脐 5 厘米范围内注射。

- 上臂后侧（如果由看护者注射）

不要在压痛、青肿、发红、鳞状或变硬的皮肤区域注射。

不要在有疤痕或伸展纹的区域注射。




### 清洁注射部位

仔细用肥皂和热水清洗双手。

用酒精棉签擦拭注射部位，晾干。

清洁后，**请勿**触碰注射部位或对其吹风或扇风。



### 检查液体

从纸盒中取出预充式注射器。

通过观察窗检查液体。本品应是澄清至浅黄色，并且可能含有微小的白色或澄清的颗粒。


也可能看到一个或多个气泡。

这是正常现象。

如药液混浊或变色，或颗粒较大，**请勿**注射。

如果您不确定，请联系您的医生或药剂师续药。

## 2. 使用预充式注射器注射古塞奇尤单抗



### 取下针帽


握住注射器针筒，并直接拔出针帽。  
如有一滴液体漏出，属于正常现象。

**取下针帽后 5 分钟内注射药物。**

**不要**将针帽重新装回去，因为这可能会损坏针头。

**不要**碰触针头或使其接触任何表面。

如果古塞奇尤单抗预充式注射器掉落，  
**请勿**使用。如需续药，请联系您的医生或药剂师。



### 手指位置和插入针头

将大拇指、食指和中指直接放在**手指凸缘**下方，如图所示。

**请勿**触碰柱塞或手指凸缘上方区域，


因为这可能会启动针头保护装置。

用另一只手捏住注射部位的皮肤。

将注射器调整到相对皮肤 45 度角的位置。


必须捏住足够多的皮肤以便进行**皮下注射**，而非肌肉注射。

像握飞镖一样快速插入针头。



**松开捏住的皮肤和调整手的位置**


捏住皮肤的那只手松开后，握住注射器针筒。



**推柱塞**

将另一只手的大拇指放在柱塞上，  
一直接下去直到按不动。





### 松开柱塞

安全防护组件将包住针头并将其锁住，  
将针头从皮肤上拔出。


### 3. 注射后



#### 扔掉用过的预充式注射器

使用后，立即将用过的注射器放入锐利物品收集盒中。

当收集盒装满时，请确保按照您的医生或护士的指导处理容器。



#### 检查注射部位

注射部位可能有少量出血或渗出液体。用棉球或纱布按住注射部位皮肤，直至停止出血。

**请勿**摩擦注射部位的皮肤。

如果需要，在注射部位贴上创可贴。

注射步骤全部完成！



需要帮助?

无论有任何问题，均可电话咨询您的医生。如需其他帮助或者提供反馈意见，请参见包装说明书中的当地代表联系信息。

**\*\*\*END OF DOCUMENT\*\*\***